

แนวทางปฏิบัติและการให้บริการของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ในสถานการณ์ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (COVID -19)

พว.กรรณิกา ธิชูโต

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ และเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งหมายถึงโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูง และสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื้อนี้จะแพร่กระจายทางฝอยละอองขนาดใหญ่ (droplets) ในระยะไม่เกิน 1-2 เมตร ผู้ป่วยมีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ปอดอักเสบ ในรายที่อาการรุนแรงจะมีภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทางศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติและการให้บริการแก่ผู้รับบริการดังนี้

1. การประเมินผู้รับบริการก่อนเข้ารับบริการ ได้แก่

- การวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ/เจ็บคอ/หอบเหนื่อย) รายงานแพทย์เจ้าของไข้รับทราบ
- การประเมินผู้รับบริการตามแบบคำถามคัดกรองผู้ป่วยและญาติก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หากมีความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้รับทราบ

2. การให้บริการและการพยาบาล

- จัดเรียงเก้าอี้ให้ผู้รับบริการนั่งรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดผู้เข้ารับบริการเข้ามาในบริเวณไม่เกิน 6 คน
- ให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask)
- เจ้าหน้าที่ใช้หลัก Standard และ Droplets Precaution ในการประเมินคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อสำหรับผู้รับบริการทุกราย โดยการล้างมือตามหลัก 5 Moment และสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) และกระจังกันใบหน้า (Face Shield)
- จัดทำฉากกั้นบนโต๊ะซักประวัติ โต๊ะตรวจในห้องตรวจ และทำความสะอาดทุกวันหลังให้บริการ
- ทำสะอาดตามหลัก 5 ส ทุกวันสุดท้ายของสัปดาห์

3. การคัดเลือกผู้รับบริการเข้าของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากในสถานการณ์ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (COVID -19)

- ผู้รับบริการที่ต้องการมาทำนัดปรึกษามีบุตรยากคู่ใหม่ทั้งสามีและภรรยาต้องได้รับวัคซีน Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และห่างจากวันนัดพบแพทย์อย่าง 2 สัปดาห์
- ผู้รับบริการที่มีนัดทำหัตถการ ได้แก่ การเก็บไข่ การย้ายตัวอ่อน ผู้รับบริการจะต้องส่งผลตรวจ Antigen test kit (ATK) ก่อนวันทำหัตถการ 3 วัน ถ้าผลเป็นลบถึงจะสามารถเข้ารับบริการทำหัตถการได้ หากผลเป็นบวกผู้รับบริการจะต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ หากไม่มีการติดเชื้อจึงจะสามารถเข้ารับบริการได้