



การเปลี่ยนท่อหลอดลมคอในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ

อุปกรณ์

1. ท่อหลอดลมคอที่ทำความสะอาดแล้ว
2. เชือกผูกท่อหลอดลม
3. สายและเครื่องดูดเสมหะ
4. สำลิก้อนกลมชุบน้ำเกลือ 0.9%(อย่างน้อย 2 ก้อน)
5. กรรไกร
6. ผ้าก๊อสนี้เหลี่ยมขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว(2 ชั้น)
7. พลาสเตอร์ม้วนขนาด 0.5 นิ้ว
8. ขามรูปไต
9. สารหล่อลื่นเช่น K-Y jelly
10. Stethoscope
11. Forceps
12. อื่นๆ เช่น 85% Trichloroacetic acid(TCA), ขี้ผึ้งคลอแรมเฟนิคอลหรือเทอรามายซิน, ไม้พันสำลี



วิธีเปลี่ยนท่อ

1. เตรียมท่อหลอดลมคอโดยใส่แกนกลางเข้าไปในท่อชั้นนอก ตามด้วยผูกเชือกผูกท่อหลอดลมกับท่อชั้นนอกและทาสารหล่อลื่นที่ปลายท่อหลอดลมคอ
2. จัดท่านั่งถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หรือท่านอนหงายหากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
3. ดูดเสมหะผ่านท่อหลอดลม
4. ใช้กรรไกรตัดเชือกผูกท่อหลอดลมและถอดท่อหลอดลมออกใส่ขามรูปไต
5. ทำความสะอาดรูเจาะคอด้วยสำลิก้อนกลมชุบน้ำเกลือ 0.9%
6. หากพบว่ามีเนื้อเยื่ออักเสบหรือเลือดออกให้ใช้ไม้พันสำลีชุบ 85% TCA ป้ายตามด้วยป้ายขี้ผึ้ง
7. ใส่ท่อหลอดลมคอที่เตรียมไว้จากข้อ1.แล้วนำแกนกลางออกตามด้วยใส่ท่อชั้นในแล้วหมุนล็อก
8. ผูกเชือกผูกท่อหลอดลมโดยขณะผูกให้ผู้ช่วยใช้นิ้วมือ1นิ้วสอดไปได้เชือก
9. ตัดเชือกส่วนที่ยาวเกินด้วยกรรไกร
10. ใส่ผ้าก๊อสรองท่อหลอดลมด้วย Forceps และแปะผ้าก๊อสด้วยพลาสเตอร์
11. ฟังปอดทั้งสองข้างและดูดเสมหะ(หากมี)