




ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง Cholera



อหิวาตกโรค คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารจากแบคทีเรีย

อุบัติการณ์

- จากประชากรทั่วโลก พบว่ามี ประชากรประมาณ 1.3-4 ล้านคนที่ติดเชื้ออหิวาตกโรค โดยมีผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง 21,000 - 143,000 ราย

ระยะฟักตัว

- ตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมง ไปจนถึง 5 วัน เฉลี่ยระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน


วิธีการติดต่อ

- ติดต่อโดยการรับประทานอาหารทะเลสุกๆดิบๆ หรือ อาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค



อาการที่พบได้

- อุจจาระเป็นน้ำปริมาณมาก
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ภาวะขาดน้ำ ช็อค



*อาจมีอาการน้อยหรือมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิต

การวินิจฉัยและรักษา

- การตรวจอุจจาระ ชนิด Darkfield
- การเพาะเชื้อจากอุจจาระ

อาการที่ต้องพามาโรงพยาบาล

- มีอาการซึม
- ปากแห้ง ตาโหล ปัสสาวะออกน้อย
- หิวน้ำบ่อยๆ
- อุจจาระเป็นน้ำปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง



การรักษา

- รักษาโดยการให้สารน้ำ แก้ไขแร่ธาตุทดแทน และการให้ยาปฏิชีวนะ

การป้องกัน



- ล้างมือด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาด
- รักษาสุขอนามัยสม่ำเสมอ
- รับประทานอาหารสุกและสะอาด

วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค

- ✓ วัคซีนชนิดเชื้อตาย
- ✓ แนะนำในผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อสูง เช่น นักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาด เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
เรียบเรียงโดย:
พญ.กัลยารัตน์ คงนัฐเศรษฐ์
รศ.พญ. ธิติมา เงินมาก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร