

คำแนะนำสำหรับการเก็บน้ำเชื้ออสุจิเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะมีบุตรยาก

1. ควรงดการหลั่งน้ำเชื้ออสุจิ 2-7 วัน ก่อนการตรวจน้ำเชื้อ
2. รับกระป๋องปลอดเชื้อสำหรับเก็บน้ำเชื้ออสุจิที่ OPD สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชั้น 2 และเก็บน้ำเชื้ออสุจิที่ห้องเก็บน้ำเชื้อบริเวณห้องคลอด (ชั้น 2)
3. ล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำเกลือให้สะอาดก่อนทำการเก็บน้ำเชื้ออสุจิ
4. ล้างอวัยวะเพศให้สะอาด แล้วเช็ดด้วยกระดาษทิชชูให้แห้งก่อนทำการเก็บน้ำเชื้ออสุจิ
5. เก็บน้ำเชื้ออสุจิด้วยวิธีสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง และให้เก็บทุกส่วนที่หลั่งออกมาลงในกระป๋องปลอดเชื้อที่ได้รับ ไม่ควรเก็บน้ำเชื้ออสุจิด้วยการมีเพศสัมพันธ์หรือสวมถุงยางอนามัย
6. นำน้ำเชื้ออสุจิส่งห้องปฏิบัติการชั้น 2 ในทันทีหรือในกรณีที่เก็บจากที่บ้านให้ส่งตรวจห้องปฏิบัติการชั้น 2 ภายใน 1 ชั่วโมง
7. รอฟังผลการตรวจที่ OPD สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชั้น 2 หรือ ห้องคลอด ตามนัดของแพทย์เจ้าของไข้



ด้วยความปรารถนาดีจาก หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

“หากมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อสอบถามที่ 0 5596 5653 ”